

## Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára

### Elontril 150 mg módosított hatóanyagleadású tabletta Elontril 300 mg módosított hatóanyagleadású tabletta

bupropion-hidroklorid

**Mielőtt elkezdheti szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mert az Ön számára fontos információkat tartalmaz.**

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További kérdéseivel forduljon kezelőorvosához vagy gyógyszerészéhez.
- Ezt a gyógyszert az orvos kizárólag Önnek írta fel. Ne adja át a készítményt másnak, mert számára ártalmas lehet még abban az esetben is, ha a betegsége tünetei az Önéhez hasonlóak.
- Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa erről kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. Lásd 4. pont.

#### A betegtájékoztató tartalma:

1. Milyen típusú gyógyszer az Elontril és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók az Elontril szedése előtt
3. Hogyan kell szedni az Elontril-t?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Hogyan kell az Elontril-t tárolni?
6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

#### 1. Milyen típusú gyógyszer az Elontril és milyen betegségek esetén alkalmazható?

Az Elontril-t az orvos az Ön depressziójának kezelésére rendelte. Ez a gyógyszer feltételezhetően az agyban található anyagokkal, a *noradrenalin*nal és a *dopamin*nal lép kölcsönhatásba, amelyeknek a depresszióban van szerepük.

#### 2. Tudnivalók az Elontril szedése előtt

##### Ne szedje az Elontril-t

- **Ha allergiás** az Elontril-ra, a bupropionra, vagy a gyógyszer (6. pontban felsorolt) egyéb összetevőjére.
- **Ha más bupropion tartalmú gyógyszert szed.**
- **Ha epilepsziában szenved vagy korábban volt már epilepsziás görcsrohama.**
- **Ha étkezési problémája van** vagy volt korábban (pl. bulimia, azaz kóros evési kényszer, vagy anorexia nervosa, azaz félelem az evéstől, elhízástól).
- **Ha agydaganata van.**
- **Ha általában sok alkoholt fogyaszt,** és most hagyta abba vagy készül abbahagyni az ivást.
- **Ha súlyos májbetegsége van.**
- **Ha a közelmúltban hagyta abba valamilyen nyugtatószer szedését,** vagy az Elontril szedése alatt készül abbahagyni.
- **Ha egyéb, depresszió kezelésére szolgáló,** úgynevezett *monoaminoxidáz-gátló* (MAOI) **gyógyszert szed vagy szedett** az elmúlt 14 nap során.

**Bármely fenti esetben azonnal forduljon kezelőorvosához, és ne vegye be az Elontril-t!**

## Figyelmeztetések és óvintézkedések

Az Elontril szedése előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.

### Gyermekek és serdülők

Az Elontril nem ajánlott 18 évesnél fiatalabb gyermekek kezelésére.

18 évesnél fiatalabb gyermekeknél antidepresszívumokkal történő kezelés esetén nagyobb az öngyilkossági gondolatok és öngyilkosságra utaló viselkedés kockázata.

### Felnőttek

**Kezelőorvosának tudnia kell, mielőtt Ön elkezdni szedni az Elontril-t:**

- **Ha Ön rendszeresen sok alkoholt fogyaszt.**
- **Ha cukorbeteg,** és ennek kezelésére inzulint vagy tablettát kap.
- **Ha korábban súlyos fejsérülése volt vagy a fejét baleset érte.**

Az Elontril 1000 ember közül körülbelül egynél görcsöt (görcsrohamot) okozhat. Ez a mellékhatás gyakoribb a fenti körülmények valamelyikének fennállása esetén. Ha görcsrohamot kapna a kezelés alatt, hagyja abba az Elontril szedését. **Több gyógyszert ne vegyen be, és keresse fel kezelőorvosát.**

- **Ha bipoláris betegségben** (szélsőséges kedélyhullámzások) **sz szenved,** mivel az Elontril a betegség újabb epizódját válthatja ki.
- **Ha máj- vagy veseproblémái vannak,** nagyobb valószínűséggel jelentkeznek mellékhatások.

**Bármely fenti esetben** kérje újra kezelőorvosa tanácsát az Elontril bevétele előtt. Lehet, hogy az orvos fokozott figyelemmel kíséri majd állapotát, vagy esetleg más kezelést javasol.

### Öngyilkossági gondolatok és depressziójának súlyosbodása

Ha Ön depresszióban szenved, előfordulhatnak önkárosító vagy öngyilkos gondolatai. Ezek gyakoribbak lehetnek az antidepresszáns kezelés kezdeti szakaszában, mert ezeknél a gyógyszereknél a hatás kialakulásához időre van szükség. Ez általában két hét, de olykor hosszabb időbe is telhet. Nagyobb valószínűséggel lehetnek ilyen gondolatai:

- Ha korábban voltak már öngyilkossági vagy önkárosító gondolatai.
- Ha Ön fiatal felnőtt. Klinikai vizsgálatokból származó információk szerint az antidepresszánsokkal kezelt, pszichiátriai betegségben szenvedő fiatal felnőttek (25 évnél fiatalabbak) esetén magasabb az öngyilkos magatartás kialakulásának veszélye.

Ha bármikor önkárosító vagy öngyilkossági gondolatai támadnak, **azonnal keresse fel kezelőorvosát, vagy menjen kórházba.**

**Hasznos lehet, ha egy rokonának vagy közeli barátjának** beszámol depressziójáról vagy szorongásos betegségéről, és megkéri, hogy olvassák el ezt a betegájékoztatót. Megkérheti őket, hogy közöljék Önnel, ha úgy gondolják, hogy depressziója, vagy szorongása súlyosbodott, vagy ha az Ön magatartásában bekövetkező változások aggasztóak.

### Egyéb gyógyszerek és az Elontril

**Ha egyéb, depresszió kezelésére szolgáló, úgynevezett monoaminoxidáz-gátló (MAOI) gyógyszert szed vagy szedett** az elmúlt 14 nap során, **közölje ezt kezelőorvosával, és ne vegye be az Elontril-t** (lásd még „Ne szedje az Elontril-t” a 2. pontban).

**Tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett, valamint szedni tervezett egyéb gyógyszereiről,** gyógynövényekről vagy vitaminkészítményekről, beleértve azokat, amelyeket Ön vásárolt magának. Lehet, hogy kezelőorvosa megváltoztatja az Elontril adagját, vagy az egyéb gyógyszerekre vonatkozóan javasol változtatást.

**Egyes gyógyszerek nem adhatók együtt Elontril-lal.** Némelyek fokozhatják a görcsrohamok kialakulásának lehetőségét. Más gyógyszerek egyéb mellékhatások kockázatát növelhetik. Néhány példát olvashat az alábbiakban, de a felsorolás nem teljes.

**A szokásosnál nagyobb lehet a görcsrohamok kialakulásának lehetősége:**

- **Ha Ön egyéb gyógyszert szed depresszió vagy más pszichés betegség kezelésére.**
- **Ha teofillint kap** asztmára vagy tüdőbetegségre.
- **Ha tramadolt szed**, amely egy erős fájdalomcsillapító.
- **Ha nyugtatószereket szed**, vagy az Elontril kezelés alatt akarja szedését abbahagyni (lásd még „Ne szedje az Elontril-t” a 2. pontban).
- **Ha malária elleni gyógyszert szed** (pl. meflokin vagy klorokint).
- **Ha stimulálószereket vagy egyéb étvágy- vagy súlycsökkentő gyógyszert szed.**
- **Ha szteroid gyógyszereket kap** (szájon át vagy injekcióban).
- **Ha úgynevezett kinolon antibiotikumokat szed.**
- **Ha bizonyos típusú antihisztaminokat szed, amelyek álmoságot okozhatnak.**
- **Ha cukorbetegség kezelésére szolgáló gyógyszert szed.**

**Bármely fenti esetben** azonnal forduljon kezelőorvosához, mielőtt bevenné az Elontril-t. Kezelőorvosa mérlegelni fogja az Elontril szedésének előnyeit és kockázatát az Ön esetében.

**A szokásosnál nagyobb lehet egyéb mellékhatások kialakulásának lehetősége:**

- **Ha Ön egyéb gyógyszert szed a depresszió kezelésére** (mint pl. az amitriptilin, fluoxetin, paroxetin, doszulepin, dezipramin vagy imipramin) vagy más pszichés betegség kezelésére (mint pl. a klozapin, riszperidon, tioridazin vagy olanzapin).
- **Ha Parkinson-betegség kezelésére szed gyógyszert** (levodopát, amantadint vagy orfenadrint).
- **Ha olyan gyógyszereket szed, amelyek befolyásolják az Elontril lebomlását az Ön szervezetében** (karbamazepin, fenitoin, valproát).
- **Ha bizonyos daganatellenes gyógyszereket szed** (pl. ciklofoszamid, ifoszfamid)
- **Ha tiklopidint vagy klopidozrelt szed, amelyeket főleg a szélütés megelőzésére alkalmaznak.**
- **Ha egyes béta-blokkolókat szed** (mint pl. a metoprolol).
- **Ha a szabálytalan szívverés kezelésére alkalmazott egyes gyógyszereket szed** (propafenont vagy flekainidet).
- **Ha a dohányzásról való leszokást segítő nikotin tapaszt használ.**

**Bármely fenti esetben** azonnal forduljon kezelőorvosához, mielőtt bevenné az Elontril-t.

**Az Elontril hatása csökkenhet**

- **Ha Ön ritonavirt vagy efavirenzet szed**, melyek a HIV-fertőzés kezelésére szolgáló gyógyszerek.

**Amennyiben ez érvényes Önre**, közölje kezelőorvosával. Orvosa ellenőrizni fogja az Elontril hatékonyságát az Ön esetében. Amennyiben szükségesnek látja, megemeli a gyógyszer adagját, vagy más terápiát ír elő az Ön depressziójának kezelésére. Kezelőorvosa tanácsa nélkül ne emelje meg az Elontril adagját, mert ez növelheti a mellékhatások, beleértve a görcsrohamok kialakulásának kockázatát.

**Az Elontril csökkentheti más gyógyszerek hatékonyságát:**

- **Ha Ön az emlőrák kezelésére szolgáló tamoxifent szed.**
- **Ha Ön digoxint szed szívbetegségére.**

**Amennyiben ez Önre érvényes**, tájékoztassa kezelőorvosát. Kezelőorvosa mérlegelheti a digoxin adagjának módosítását.

**Az Elontril egyidejű alkalmazása alkohollal**

Az alkohol befolyásolhatja az Elontril hatását, és együttes használatuk ritkán befolyásolhatja az idegi és pszichés állapotot. Némelyek azt tapasztalják, hogy az Elontril szedése alatt érzékenyebbek az alkoholra. Kezelőorvosa javasolni fogja, hogy ne fogyasszon alkoholt (sört, bort vagy egyéb szeszesitalt) amíg az Elontril-t szedi, vagy legalább próbáljon nagyon keveset inni. Ha azonban jelenleg sokat iszik, ne hagyja abba hirtelen az ivást, mert fennállhat a veszélye, hogy görcsroham lép fel Önnél.

**Tájékoztassa kezelőorvosát ivási szokásáról** mielőtt elkezdi szedni az Elontril-t.

**Vizelettesztekre gyakorolt hatás**

Az Elontril befolyásolhatja egyes, gyógyszerek kimutatására szolgáló vizelettesztek eredményét. Amennyiben ilyen tesztre van szüksége, tájékoztassa kezelőorvosát vagy a kórházi szakembert arról, hogy Ön Elontril-t szed.

**Terhesség és szoptatás**

Ne szedjen Elontril-t, ha terhes, illetve ha fennáll Önnél a terhesség lehetősége vagy gyermeket szeretne, kivéve, ha ezt orvosa javasolja.

Beszélje meg kezelőorvosával vagy gyógyszerészével, mielőtt elkezdi szedni ezt a gyógyszert. Egyes - de nem mindegyik – klinikai vizsgálatban a születési rendellenességek, különösen a szívfejlődési rendellenességek kockázatának emelkedését jelentették olyan csecsemőknél, akiknél az anya Elontril-t szedett. Nem ismeretes, hogy ezeket az Elontril alkalmazása okozta-e.

Az Elontril összetevői bejuthatnak az anyatejbe. Kérjen tanácsot kezelőorvosától vagy gyógyszerésztől, mielőtt szedné az Elontril-t.

**A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre**

Amennyiben az Elontril Önnél szédülést okoz, a kezelés alatt ne vezessen gépjárművet és ne kezeljen gépeket.

**3. Hogyan kell szedni az Elontril-t?**

**Ezt a gyógyszert mindig pontosan a kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően szedje.** Az alábbiak a javasolt adagok, de a kezelőorvosa tanácsai személyesen Önnel szólnak. Amennyiben nem biztos az adagolást illetően, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészt.

**Bizonyos időbe telhet, mielőtt elkezdi jobban érezni magát.** Időre van szükség, olykor hetekre, hónapokra, hogy a gyógyszer teljes hatása kialakuljon. Amikor kezdi jobban érezni magát, orvosa azt tanácsolhatja, hogy szedje tovább az Elontril-t, a depresszió visszatérésének megelőzése érdekében.

***Mennyi gyógyszert kell bevenni?***

A készítmény ajánlott adagja fenőtteknek naponta **egy** 150 mg-os tablettá.

Amennyiben depressziója nem javul több heti kezelés után, **kezelőorvosa naponta 300 mg-ra emelheti az Ön adagját.**

**Az Elontril tablettá előírt adagját reggel vegye be. Ne vegyen be többször Elontril-t, csak minden nap egyszer.**

A tablettát egy héj fedi, amelyen keresztül lassan szabadul fel a gyógyszer az Ön szervezetében. Előfordulhat, hogy észrevesz a székletében valamit, amely tablettára hasonlít. Ez az üres héj, amint távozik a szervezetéből.

**A tablettákat egészben kell lenyelni.** Szétrágni, összetörni vagy elvágni nem szabad – ha ezt teszi, fennáll a túladagolás veszélye, mivel a gyógyszer túl gyorsan szabadul fel a szervezetében. Így nagyobb a valószínűsége mellékhatások, köztük a görcsrohamok kialakulásának.

**Némelyeknél megmarad a napi egy 150 mg-os tablettá adag** kezelésük teljes időtartama alatt. Kezelőorvosa Önnel is rendelheti így, ha máj- vagy veseproblémája van.

***Meddig kell szedni a gyógyszert?***

**Csak Ön és kezelőorvosa dönthetik el, meddig kell szednie az Elontril-t.** Hetekig vagy hónapokig is eltarthat, amíg javulás jelentkezik. Rendszeresen beszélje meg orvosával tüneteinek alakulását, hogy

eldöntsék, meddig kell szednie a gyógyszert. Amikor kezdi jobban érezni magát, kezelőorvosa tanácsolhatja azt, hogy szedje tovább az Elontril-t, a depresszió visszatérésének megelőzése érdekében.

#### **Ha az előírtnál több Elontril-t vett be**

Ha túl sokat vett be a tablettákból, fokozódhat a görcsrohamok kialakulásának a kockázata. **Ne késlekedjen.** Azonnal forduljon kezelőorvosához, vagy lépjen kapcsolatba a legközelebbi kórház sürgősségi osztályával.

#### **Ha elfelejtette bevenni az Elontril-t**

Ha elfelejtett bevenni egy adagot, várjon, és vegye be a következő tablettát a szokásos időpontban. **Ne vegyen be kétszeres adagot a kihagyott tablettá pótlására.**

#### **Ha idő előtt abbahagyja az Elontril szedését**

**Ne** hagyja abba az Elontril szedését, ill. ne csökkentse az adagot, amíg nem beszélte meg kezelőorvosával.

Ha bármilyen további kérdése van a gyógyszer alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

## **4. Lehetséges mellékhatások**

Mint minden gyógyszer, így ez a gyógyszer is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek.

#### ***Görcsök, görcsrohamok***

1000 ember közül kb. egynél áll fenn a görcs (görcsroham, görcsös rángás) kialakulásának a kockázata az Elontril szedése alatt. Ennek a valószínűsége nagyobb, ha Ön túl nagy adagot vesz be, ha bizonyos gyógyszereket szed, vagy a szokásosnál veszélyeztetettebb görcsök kialakulása szempontjából. Ha emiatt aggódik, beszéljen kezelőorvosával.

**Ha görcsroham lép fel Önnél,** mondja el kezelőorvosának, miután állapota rendeződött. **Ne vegyen be többé a tablettából.**

#### ***Allergiás reakciók***

Néhány betegnél az Elontril allergiás reakciókat válthat ki. Ezek közé tartoznak a következők:

- Bőrvörösség vagy kiütések (csalánkiütés), hólyagok vagy viszkető göbök a bőrön. Bizonyos bőrkiütések kórházi kezelést igényelnek, különösen, ha a száj vagy szem gyulladásával járnak.
- Szokatlan zihálás, nehézlégzés.
- A szemhéj, az ajkak vagy a nyelv duzzanata.
- Ízületi és izomfájdalom.
- Ájulás, eszméletvesztés.

**Amennyiben bármilyen allergiás reakció jelentkezik Önnél,** azonnal forduljon kezelőorvosához. **Ne vegyen be többé a tablettából.**

**Az allergiás reakciók hosszabb ideig fennállhatnak.** Ha kezelőorvosa rendel valamit az allergiás tünetek csillapítására, ügyeljen arra, hogy ezt a kezelést a végéig folytassa.

#### ***Egyéb mellékhatások***

**Nagyon gyakori mellékhatások:** 10 betegből több mint 1 beteget érinthet

- Alvási nehézségek. Ügyeljen arra, hogy az Elontril-t mindig reggel vegye be.
- Fejfájás.
- Szájszárazság.
- Émelygés, hányás.

**Gyakori mellékhatások:** 10 betegből legfeljebb 1 beteget érinthet

- Láz, szédülés, viszketés, izzadás és bőrkiütés (ami néha allergiás reakció következménye).
- Reszketés, remegés, gyengeség, fáradtság, mellkasi fájdalom.
- Szorongás vagy izgatottság érzése.
- Hasi fájdalom vagy egyéb panaszok (székrekedés), az ízérzés megváltozása, étvágytalanság (anorexia).
- Vérnyomás emelkedés (esetenként súlyos), kipirulás.
- Fülcsengés, látászavar.

**Nem gyakori mellékhatások:** 100 betegből legfeljebb 1 beteget érinthet

- Lehangoltság érzése (lásd még a 2. pontban „Az *Elontril* fokozott elővigyázatossággal alkalmazható”, „*Öngyilkossági gondolatok és depressziójának súlyosbodása*” alatt).
- Zavartság.
- Koncentrációs zavarok.
- Szaporább szívverés.
- Súlyvesztés.

**Ritka mellékhatások:** 1000 betegből legfeljebb 1 beteget érinthet

- Görcsrohamok.

**Nagyon ritka mellékhatások:** 10 000 betegből legfeljebb 1 beteget érinthet

- Szívdobogásérzés, ájulás.
- Izomrángás, izommerevség, akaratlan mozgások, járászavar vagy az izommozgások kivitelezésének zavara.
- Nyugtalanlás, ingerlékenység, ellenségesség, agresszivitás érzése, különös álmok, bizsergés vagy zsibbadás, a memória romlása.
- A bőr vagy a szemfehérje sárgás elszíneződése (*sárgaság*), amelynek oka a májenzim-értékek emelkedése, májgyulladás lehet.
- Súlyos allergiás reakciók; bőrkiütés ízületi és izomfájdalommal együtt.
- A vércukor-értékek megváltozása.
- A szokásosnál több vagy kevesebb vizelet ürítése.
- Vizelet inkontinencia (akaratlan vizeletürítés, vizeletcsepegés).
- Súlyos bőrkiütések, melyek a száj körül vagy más testtájakon jelenhetnek meg, és életveszélyesek lehetnek.
- A pszoriázis súlyosbodása (pikkelysömör, a vörös bőrfelület foltokban történő megvastagodása).
- Irreális vagy idegenszerű érzések (*deperszonalizáció*), nem jelenlévő dolgok látása vagy hallása (*hallucinációk*), nem valódi dolgok érzése vagy feltételezése (*delúziók*), kóros mértékű gyanakvás, bizalmatlanság (*paranoia*).

### Egyéb mellékhatások

Kevés betegnél előfordultak egyéb mellékhatások is, de ezek pontos gyakorisága nem ismert:

- önkárosító vagy öngyilkos gondolatok jelentkezése az *Elontril* szedése alatt, vagy röviddel a kezelés abbahagyása után (lásd 2. pont, „Tudnivalók az *Elontril* szedése előtt”). Ha ilyen gondolatai vannak, **forduljon kezelőorvosához vagy menjen egyenesen kórházba.**
- a valósággal való kapcsolat elvesztése, képtelenség világosan gondolkozni vagy dönteni (*pszichózis*); egyéb tünetek, melyek közt lehetnek hallucinációk és/vagy delúziók.
- a vörösvértestek számának csökkenése (vérszegénység, *anémia*), a fehérvérsejtek számának csökkenése (*leukopénia*) és a vérlemezkék számának csökkenése (*trombocitopénia*),
- a vér nátriumszintjének csökkenése (*hyponatraemia*).

### Mellékhatások bejelentése

Ha Önnek bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. Ez a beteg tájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. A mellékhatásokat közvetlenül a hatóság részére is bejelentheti az [V. függelékben](#) található elérhetőségeken keresztül.

A mellékhatások bejelentésével Ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy minél több információ álljon rendelkezésre a gyógyszer biztonságos alkalmazásával kapcsolatban.

## 5. Hogyan kell az Elontril-t tárolni?

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

A csomagoláson feltüntetett lejárati idő után ne szedje ezt a gyógyszert. A lejárati idő az adott hónap utolsó napjára vonatkozik.

A nedvességtől és fénytől való védelem érdekében az eredeti csomagolásban tárolandó.

A tartályban egy aktív szén és szilikagél tartalmazó lezárt csomag van, a tabletták szárazon tartása céljából. Ezt mindig tartsa a tartályban. Ne nyelje le.

Semmilyen gyógyszert ne dobjon a szennyvízbe vagy a háztartási hulladékba. Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy mit tegyen a már nem használt gyógyszereivel. Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét.

## 6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

### Mit tartalmaz az Elontril?

A készítmény hatóanyaga a bupropion-hidroklorid. Minden tableta 150 mg vagy 300 mg bupropion-hidrokloridot tartalmaz.

Egyéb összetevők:

Tablettamag: poli(vinil-alkohol), glicerin-dibehenát; bevonat: etilcellulóz, povidon K-90, makrogol 1450, metakrilsav-etil-akrilát-kopolimer diszperzió, szilícium-dioxid, trietil-citrát.  
Jelölőtinta: sellak glaze, fekete vas-oxid (E172) és ammónium-hidroxid.

### Milyen az Elontril külleme és mit tartalmaz a csomagolás?

Az Elontril 150 mg tableta krémfehér vagy halványsárga kerek tableta, az egyik oldalán „GS5FV” fekete tinta jelzéssel, a másik oldaluk sima. Egy doboz 7, 30 vagy 90 (3x30) tablettát tartalmaz polietilén tartályban.

Az Elontril 300 mg tableta: krémfehér vagy halványsárga kerek tableta, az egyik oldalán „GS5YZ” fekete tinta jelzéssel, a másik oldaluk sima. Egy doboz 7, 30 vagy 90 (3x30) tablettát tartalmaz polietilén tartályban.

Nem feltétlenül mindegyik kiszerelés kerül kereskedelmi forgalomba!

### A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

GlaxoSmithKline Kft.  
1124 Budapest  
Csörsz u. 43.

### Gyártó:

Aspen Bad Oldesloe GmbH  
Industriestrasse 32-36.  
23843 Bad Oldesloe  
Németország

### Ezt a gyógyszert az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban az alábbi neven engedélyezték:

*Wellbutrin XR*: Ausztria, Belgium, Ciprus, Görögország, Hollandia, Lengyelország, Luxemburg, Málta, Portugália, Svájc, Szlovénia

<i>Wellbutrin:</i>	Olaszország
<i>Elontril:</i>	Cseh Köztársaság, Észtország, Hollandia, Lettország, Litvánia, Németország, Magyarország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia
<i>Magerion:</i>	Németország
<i>Wellbutrin Retard:</i>	Izland, Norvégia
<i>Voxra:</i>	Finnország, Svédország
<i>Carmubine:</i>	Ausztria
<i>Bupropion Hydrochloride GSK:</i>	Hollandia

OGYI-T-20351/01	Elontril 150 mg módosított hatóanyagleadású tabletta (30x)
OGYI-T-20351/02	Elontril 300 mg módosított hatóanyagleadású tabletta (30x)

**A betegájékoztató legutóbbi felülvizsgálatának dátuma: 2017. szeptember**