

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára

Requip-Modutab 2 mg retard filmtabletta
Requip-Modutab 4 mg retard filmtabletta
Requip-Modutab 8 mg retard filmtabletta

ropinirol

Mielőtt elkezdni szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mert az Ön számára fontos információkat tartalmaz.

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További kérdéseivel forduljon kezelőorvosához vagy gyógyszerészéhez.
- Ezt a gyógyszert az orvos kizárólag Önnek írta fel. Ne adja át a készítményt másnak, mert számára ártalmas lehet még abban az esetben is, ha a betegsége tünetei az Önéhez hasonlóak.
- **Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa erről kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. Lásd 4. pont.**

A betegtájékoztató tartalma:

1. Milyen típusú gyógyszer a Requip-Modutab és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók a Requip-Modutab szedése előtt
3. Hogyan kell szedni a Requip-Modutab-ot?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Hogyan kell a Requip-Modutab-ot tárolni?
6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

1. Milyen típusú gyógyszer a Requip-Modutab és milyen betegségek esetén alkalmazható?

A Requip-Modutab hatóanyaga a ropinirol, amely az úgynevezett **dopamin agonista** gyógyszerek közé tartozik. A dopamin agonisták hasonlóképpen hatnak az agyban, mint a dopamin nevű természetes anyag.

A Requip-Modutab retard filmtablettát a Parkinson-kór kezelésére alkalmazzák.

A Parkinson-kórban szenvedő betegek agyának egyes részeiben alacsony a dopamin-szint. A ropinirol hasonlóképpen hat, mint a természetes dopamin, és ezáltal mérsékli a Parkinson-kór tüneteit.

2. Tudnivalók a Requip-Modutab szedése előtt

Ne szedje a Requip-Modutab-ot:

- ha **allergiás** a ropinirolra vagy a gyógyszer (6. pontban felsorolt) egyéb összetevőjére,
 - ha **súlyos vesebetegsége** van, amely nem igényel rendszeres művese (dialízis) kezelést,
 - ha **májbetegsége** van.
- **Közölje kezelőorvosával**, ha úgy gondolja, hogy a fentiek bármelyike Önnél is fennáll.

Figyelmeztetések és óvintézkedések

Mielőtt elkezdni szedni a Requip-Modutab-ot, kezelőorvosának tudnia kell arról:

- ha Ön **terhes**, vagy úgy gondolja, hogy terhes;
- ha **szoptat**;
- ha **nincs még 18 éves**;
- ha **komoly szívproblémája** van;

OGYEI/39778/2018

OGYEI/39780/2018

OGYEI/39782/2018

- ha **mentális állapotát érintő súlyos problémája** van;
- ha szokatlan **kényszert és/vagy viselkedést** tapasztal (lásd 4. pont);
- ha **érzékeny egyes cukorfajtákra** (pl. laktózra).

Tájékoztassa kezelőorvosát, ha olyan tüneteket észlel a Requip-Modutab-kezelés abbahagyása vagy csökkentése esetén, mint **depresszió, levertség, szorongás, fáradtságérzés, izzadás vagy fájdalmak**. Ha a tünetek néhány hétnél tovább fennmaradnak, kezelőorvosának esetleg módosítania kell az Ön kezelését.

Beszéljen kezelőorvosával, ha Ön vagy családja/gondozója azt veszi észre, hogy késztetés vagy erős vágy alakul ki Önben olyan viselkedésformák iránt, amelyek nem jellemzőek Önre vagy nem tud ellenállni a késztetésnek, vágnak vagy kísértésnek, hogy olyan tevékenységeket végezzen, amelyek árthatnak Önnek vagy másoknak. Ezeket a viselkedésformákat impulzuskontroll-zavaroknak hívják, ide tartozik a szerencsejáték-függőség, a túlzott mértékű evés vagy költekezés, fokozott szexuális étvágy vagy az abnormálisan gyakori szexuális gondolatok/érzések. Kezelőorvosa módosíthatja az Ön által szedett készítmény adagját, vagy abbahagyhatja a kezelést az adott készítménnyel.

➔ **Tájékoztassa orvosát**, ha úgy gondolja, hogy a fentiek bármelyike Önnél is fennáll. Kezelőorvosa dönthet úgy, hogy a Requip-Modutab nem megfelelő az Ön számára, vagy hogy a gyógyszereszedés alatt további ellenőrzésekre lesz szükség.

Mialatt szedi a Requip-Modutab-ot

Mondja el orvosának, ha Ön vagy családja észreveszi, hogy Önnél bármilyen **szokatlan viselkedés** (pl. **szokatlan késztetés szerencsejátékra** vagy **fokozott szexuális késztetés és/vagy viselkedés**) jelentkezik, mialatt a Requip-Modutab-ot szedi. Lehet, hogy orvosának meg kell változtatnia a gyógyszer adagolását, vagy le kell állítania a szedését.

A dohányzás és a Requip-Modutab

Mondja el orvosának, ha a Requip-Modutab szedése alatt elkezdi dohányozni, vagy abbahagyja a dohányzást. Orvosa esetleg változtat az adagoláson.

Egyéb gyógyszerek és a Requip-Modutab

Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett, valamint szedni tervezett egyéb gyógyszereiről, beleértve a gyógynövény készítményeket vagy a vénynélkül kapható készítményeket is.

Ne felejtse el tájékoztatni kezelőorvosát vagy gyógyszerészét, ha a Requip-Modutab szedése alatt egy újabb gyógyszert kezd szedni.

Egyes gyógyszerek befolyásolhatják a Requip-Modutab hatását, vagy elősegíthetik mellékhatások jelentkezését. A Requip-Modutab is befolyásolhatja más gyógyszerek hatását.

Ilyen gyógyszerek a következők:

- a **depresszió** kezelésére szolgáló **fluvoxamin**;
- egyéb **pszichiátriai betegségek** kezelésére szolgáló gyógyszerek, pl. **szulpirid**;
- **hormonpótló gyógyszerek**;
- **metoklopramid**, amelyet **hányinger** és **gyomorégés** kezelésére alkalmaznak;
- **ciprofloxacín** vagy **enoxacín antibiotikumok**;
- minden egyéb **gyógyszer**, amelyet a **Parkinson-kór kezelésére** alkalmaznak.

➔ **Mondja el orvosának**, ha ezen gyógyszerek bármelyikét szedi vagy nemrégiben szedte.

További vérvizsgálatokra lesz szüksége, amennyiben az alábbi típusú gyógyszereket szedi egyidőben a Requip-Modutab-bal:

- K-vitamin antagonistá típusú véralvadásgátló gyógyszerek, mint pl. a warfarin, acenokumarol.

A Requip-Modutab egyidejű bevétele étellel és itallal

A Requip-Modutab étellel együtt vagy anélkül egyaránt bevehető, ahogy az Önnek megfelel.

Terhesség és szoptatás

A Requip-Modutab szedése terhesség alatt nem ajánlott, kivéve, ha a kezelőorvos úgy dönt, hogy az Ön számára a Requip-Modutab szedésének várható előnye meghaladja a születendő gyermek esetleges károsodásának kockázatát.

A Requip-Modutab szedése szoptatás alatt nem ajánlott, mert hatással lehet a tejtermelésre. Azonnal **jelezze orvosának**, ha terhes, úgy gondolja, hogy terhes, vagy ha terhességet tervez. Hasonló tanácsot fog adni orvosa, ha Ön szoptat vagy szoptatni készül. Orvosa a Requip-Modutab szedésének felfüggesztését javasolhatja.

A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre

A Requip-Modutab álmodást okozhat. **Rendkívül erős álmodást is okozhat**, és némelyek néha **minden előjel nélkül hirtelen elalszanak**.

A Requip-Modutab hallucinációkat okozhat (olyan dolgok látása, hallása vagy érzése, melyek a valóságban nincsenek jelen). Ha ilyet tapasztal, ne vezessen gépjárművet és ne kezeljen gépeket.

Ha Önnél ilyen hatás jelentkezne, **ne vezessen gépjárművet, ne kezeljen gépet, és kerüljön el** minden olyan helyzetet, amikor az álmodás vagy az elalvás Ön (vagy mások) számára súlyos sérülés vagy halálos baleset veszélyét jelentheti. Ne vegyen részt ilyen tevékenységben, amíg ez a hatás meg nem szűnik.

→ **Beszéljen kezelőorvosával**, ha ez gondot okoz Önnek.

A Requip-Modutab laktózt tartalmaz

A Requip-Modutab retard filmtabletta kis mennyiségben **laktózt** (tejcukor) tartalmaz. Amennyiben kezelőorvosa korábban már figyelmeztette Önt, hogy bizonyos cukrokra érzékeny, keresse fel orvosát, mielőtt elkezdi szedni ezt a gyógyszert.

A 4 mg-os retard filmtabletta **Sunset yellow FCF (E110)** színezőanyagot tartalmaz, amely egyes esetekben allergiás reakciót okozhat.

3. Hogyan kell szedni a Requip-Modutab-ot?

A gyógyszert mindig a kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően szedje. Amennyiben nem biztos az adagolást illetően, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

Alkalmazása gyermekeknél és serdülőknél

A Requip-Modutab-ot ne adja gyermekeknek. A Requip-Modutab-ot általában nem rendelik 18 évesnél fiatalabbaknak.

Lehet, hogy egyedül csak Requip-Modutab-ot fog kapni Parkinson-betegsége kezelésére. De az is lehet, hogy Requip-Modutab-ot és egy másik Parkinson-kór elleni gyógyszert, L-dopát (más néven levodopát) is rendel az orvos. Ha Ön L-dopát szed, lehet, hogy befolyásolhatatlan rángó mozgást fog érezni, amikor elkezdi szedni a Requip-Modutab-ot. Mondja el kezelőorvosának, ha ez történik, mivel lehet, hogy az L-dopa adagját csökkenteni kell.

A Requip-Modutab retard filmtablettát úgy fejlesztették ki, hogy a gyógyszer 24 órán keresztül szabaduljon fel belőle. Ha Önnél olyan állapot lép fel, amelynek során a gyógyszer túl gyorsan halad át a szervezetén (pl. hasmenés), a tabletták lehet, hogy nem esnek szét teljesen és nem hatnak megfelelően. Megtörténhet, hogy tablettá(ka)t fog látni a székletében. Ha ez előfordul, minél hamarabb szóljon erről kezelőorvosának.

Mennyi Requip-Modutab-ot kell szednie?

Időre van szükség ahhoz, hogy az Ön számára legmegfelelőbb adagot meghatározzák.

A Requip-Modutab retard filmtabletta **ajánlott kezdő adagja** naponta egyszer 2 mg az első héten. A kezelés második hetétől orvosa a Requip-Modutab retard filmtabletta adagját naponta egyszer 4 mg-ra emelheti. Ha Ön nagyon idős, kezelőorvosa lehet, hogy lassabb ütemben emeli az adagot. A továbbiakban az orvos addig változtatja az adagolást, amíg az Ön számára legmegfelelőbb adagot eléri. Egyes esetekben akár naponta 24 mg Requip-Modutab retard filmtablettára is szükség lehet.

Ha a kezelés elején mellékhatásokat észlel, amelyek nehezen elviselhetők, beszéljen kezelőorvosával. Lehet, hogy orvosa azt fogja tanácsolni, hogy térjen át alacsonyabb adagra egy ropinirol filmtablettából (ez gyorsabb hatóanyagleadású), amelyet naponta háromszor kell szedni.

Ne szedjen több Requip-Modutab-ot, mint amennyit kezelőorvosa javasolt.

A Requip-Modutab hatásának kialakulásához néhány hétre van szükség.

A Requip-Modutab adagok bevétele

A Requip-Modutab-ot naponta egyszer, mindig azonos időben kell bevenni.

A Requip-Modutab retard filmtablettát egészben, egy pohár vízzel nyelje le.

A retard filmtablettát nem szabad összetörni, szétrágni vagy összenyomni. Ha ezt teszi, fennáll a túladagolás veszélye, mivel így a gyógyszer túl gyorsan szabadul fel, és jut a szervezetébe.

Ha a (gyors hatóanyagleadású) ropinirol filmtabletta szedéséről vált

Kezelőorvosa a Requip-Modutab retard filmtabletta adagolását az eddig szedett (gyors hatóanyagleadású) ropinirol filmtabletta adagja alapján határozza meg.

A gyógyszerváltás előtti napon szedje a (gyors hatóanyagleadású) ropinirol filmtablettát a szokásos módon. Majd a következő reggel vegye be a Requip-Modutab retard filmtablettát, és többet ne szedje a (gyors hatóanyagleadású) ropinirol filmtablettát.

Ha az előírtnál több Requip-Modutab-ot vett be

Azonnal forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ha lehet, mutassa meg a Requip-Modutab dobozát.

A Requip-Modutab túladagolása esetén a következő tünetek fordulhatnak elő: émelygés vagy hányás, szédülés (forgó érzés), álmoság, szellemi vagy fizikai fáradtság, ájulás, hallucinációk.

Ha elfelejtette bevenni a Requip-Modutab-ot

Ne vegyen be újabb filmtablettát vagy kétszeres adagot a kihagyott adag pótlására.

Ha egy vagy több napig nem vette be a Requip-Modutab-ot, kérje kezelőorvosa tanácsát az újrakezdéssel kapcsolatban.

Ha idő előtt abbahagyja a Requip-Modutab szedését

Ne hagyja abba a Requip-Modutab szedését javaslat nélkül.

Mindaddig szedje a Requip-Modutab-ot, ameddig azt kezelőorvosa javasolja. Ne hagyja abba hirtelen a gyógyszer szedését anélkül, hogy kezelőorvosával megbeszélte volna.

Ha hirtelen hagyja abba a Requip-Modutab szedését, Parkinson-betegségének tünetei gyorsan rosszabbodhatnak. A kezelés hirtelen leállítása nyomán kialakulhat Önnél egy neuroleptikus malignus szindróma nevű kórállapot, amely súlyos egészségügyi kockázatot jelenthet. A tünetek magukban foglalhatják az akinéziát (az izommozgások hiányát), az izommerevséget, a lázat, az instabil vérnyomást, a tachikardiát (gyorsult szívverés), a zavarodottságot, és a tudatállapot csökkent éberségi szintjét (pl. kómát).

Ha abba kell hagynia a Requip-Modutab szedését, kezelőorvosa fokozatosan fogja lecsökkenteni az adagját.

Ha bármilyen további kérdése van a gyógyszer alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

4. Lehetséges mellékhatások

Mint minden gyógyszer, így ez a gyógyszer is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek.

A Requip-Modutab mellékhatásai leginkább akkor jelentkeznek, amikor először kezdi el szedni, vagy amikor emelik az adagot. A mellékhatások általában enyhék, és mérséklődnek, amikor már egy kis ideje szedi a gyógyszert. Ha aggódik a mellékhatások miatt, beszélje meg kezelőorvosával.

Nagyon gyakori mellékhatások

Ezek **10** Requip-Modutab-ot szedő **betegből több mint 1-nél** fordulhatnak elő:

- ájulás;
- álmoság;
- hányinger.

Gyakori mellékhatások

Ezek **10** Requip-Modutab-ot szedő **betegből legfeljebb 1-nél** fordulhatnak elő:

- hirtelen elalvás az álmoság előzetes érzése nélkül (*hirtelen elalvási epizódok*);
- hallucinációk (olyan dolgok látása, melyek a valóságban nincsenek jelen);
- hányás;
- szédülés (forgó érzés);
- gyomorégés;
- hasi fájdalom;
- székrekedés;
- a lábszár, a lábfej vagy a kéz duzzanata.

Nem gyakori mellékhatások

Ezek **100** Requip-Modutab-ot szedő **betegből legfeljebb 1-nél** fordulhatnak elő:

- szédülés-érzés vagy ájulás, különösen hirtelen felállás esetén (ezt a vérnyomás leesése okozza);
- napközben erős álmoság érzése (kóros aluszékonyság);
- mentális problémák, mint delírium (súlyos zavartság), téveszmék (ésszerűtlen gondolatok) vagy paranoia (oktalan gyanakvás vagy üldözöttség érzése).

Néhány betegnél előfordulhatnak a következő mellékhatások (a gyakoriságuk nem ismert – nem becsülhető meg a rendelkezésre álló adatok alapján):

- **allergiás reakciók**, mint vörös, viszkető **duzzanatok** a bőrön (csalánkiütés), az arc, az ajak, a száj, a nyelv vagy a torok duzzanata, amely nyelési vagy légzési nehézséget okozhat, **bőrkiütés** vagy erős viszketés (lásd 2. pont).
- a **májműködés** megváltozása, amit vérvizsgálattal mutattak ki.
- agresszív viselkedés.
- a Requip túlzott alkalmazása (olyan nagyobb adagok utáni sóvárgás, amelyek meghaladják a mozgással kapcsolatos (motoros) tünetek kontrollálásához szükséges szintet, és amelyet dopamin diszreguláció szindrómának neveznek).
- képtelen ellenállni a készletesnek, hévnek vagy kísértésnek, hogy olyan cselekedetet végezzen, amely árthat Önnek vagy másoknak, beleértve:
 - Erős késztetés a túlzott mértékű szerencsejáték iránt a súlyos személyes vagy családi következmények ellenére.
 - Megváltozott vagy fokozott, Ön vagy mások számára jelentős aggodalomra okot adó szexuális érdeklődés és viselkedés, például fokozott szexuális étvágy.
 - Túlzott mértékű, kontrollálhatatlan vásárlás vagy költekezés.
 - Falási rohamok (rövid időn belül nagy mennyiségű étel elfogyasztása) vagy kényszeres evés (a normálisnál és az éhség csillapításához szükséges mennyiségnél nagyobb mennyiségű étel elfogyasztása).

- A Requip-Modutab-bal való kezelés abbahagyása vagy az adag csökkentése esetén: depresszió, levertség, szorongás, fáradtságérzés, izzadás vagy fájdalom léphet fel (ezt dopamin agonista megvonási szindrómának vagy DAWS-nak nevezik).

Amennyiben a fenti viselkedésformák közül bármelyiket tapasztalja, azonnal beszéljen orvosával, aki kiválasztja a megfelelő módszert az Ön tüneteinek kezelésére vagy csökkentésére.

Ha a Requip-Modutab-ot L-dopával szedi

Azoknál a betegeknél, akik a Requip-Modutab-ot L-dopával szedik, egy idő után egyéb mellékhatások is kialakulhatnak:

- A befolyásolhatatlan mozgás (diszkinézia) nagyon gyakori mellékhatás. Ha Ön L-dopát szed, lehet, hogy befolyásolhatatlan mozgást (diszkinéziát) fog tapasztalni, amikor elkezdi szedni a Requip-Modutab-ot. Mondja el orvosának, ha ez történik, mivel lehet, hogy gyógyszereinek adagját csökkenteni kell.
- A zavartságérzés gyakori mellékhatás.

Mellékhatások bejelentése

Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik.

A mellékhatásokat közvetlenül a hatóság részére is bejelentheti a következő elérhetőségeken keresztül:

Magyarország

Országos Gyógyszerészeti és
Élelmezés-egészségügyi Intézet
Postafiók 450
H-1372 Budapest

Honlap: www.ogyei.gov.hu

A mellékhatások bejelentésével Ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy minél több információ álljon rendelkezésre a gyógyszer biztonságos alkalmazásával kapcsolatban.

5. Hogyan kell a Requip-Modutab-ot tárolni?

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

A dobozon vagy a buborékcsomagoláson feltüntetett lejárati idő (Felhasználható / Felh. / EXP) után ne szedje ezt a gyógyszert. A lejárati idő az adott hónap utolsó napjára vonatkozik.

Legfeljebb 25°C-on, a fénytől való védelem érdekében az eredeti csomagolásban tárolandó.

Semmilyen gyógyszert ne dobjon a szennyvízbe vagy a háztartási hulladékba. Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy mit tegyen a már nem használt gyógyszereivel. Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét.

6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

Mit tartalmaz a Requip-Modutab?

- A készítmény hatóanyaga a ropinirol. Egy retard filmtabletta 2 mg, 4 mg vagy 8 mg ropinirolt tartalmaz (ropinirol-hidroklorid formájában).
- Egyéb összetevők:
Retard tabletták mag: hipromellóz, hidrogénezett ricinusolaj, karmellóz-nátrium, povidon, maltodextrin, magnézium-sztearát, laktóz-monohidrát, vízmentes koloid szilícium-dioxid, mannit (E421), sárga vas-oxid (E172), glicerin-dibehenát.

Filmbevonat:

2 mg-os retard filmtabletta: „Opadry pink OY-S-24900” (hipromellóz, sárga vas-oxid (E172), titán-dioxid (E171), makrogol 400, vörös vas-oxid (E172)).

4 mg-os retard filmtabletta: „Opadry light brown OY-27207” (hipromellóz, titán-dioxid (E171), makrogol 400, sunset yellow FCF (E110), indigókármin (E130)).

8 mg-os retard filmtabletta: „Opadry red 03B25227” (hipromellóz, sárga vas-oxid (E172), titán-dioxid (E171), fekete vas-oxid (E172), makrogol 400, vörös vas-oxid (E172)).

Milyen a Requip-Modutab külleme és mit tartalmaz a csomagolás?

Requip-Modutab 2 mg-os retard filmtabletta: rózsaszín, mindkét oldalán domború felületű, hosszúkás, filmbevonatú tabletták, egyik oldalán mélynyomású „GS”, másik oldalán „3V2” jelzéssel. Egy dobozban 28, 42 vagy 84 tabletták van.

Requip-Modutab 4 mg-os retard filmtabletta: világosbarna, mindkét oldalán domború felületű, hosszúkás, filmbevonatú tabletták, egyik oldalán mélynyomású „GS”, másik oldalán „WXG” jelzéssel van ellátva. Egy dobozban 28 vagy 84 tabletták van.

Requip-Modutab 8 mg-os retard filmtabletta: piros, mindkét oldalán domború felületű, hosszúkás, filmbevonatú tabletták, egyik oldalán mélynyomású „GS”, másik oldalán „5CC” jelzéssel. Egy dobozban 28 vagy 84 tabletták van.

Csomagolás:

Retard filmtabletták PVC/PCTFE (poliklór-trifluor-etilén)/Alumínium vagy gyermekbiztos PVC/PE/PVdC/Alumínium/papír buborékcsomagolásban és dobozban.

2 mg-os retard filmtabletta: 28, 42 és 84 tablettás készletek.

4 mg-os retard filmtabletta: 28 és 84 tablettás készletek

8 mg-os retard filmtabletta: 28 és 84 tablettás készletek.

Nem feltétlenül mindegyik készlet kerül kereskedelmi forgalomba.

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

GlaxoSmithKline Kft.

1124 Budapest

Csörsz u. 43.

Gyártó:

SmithKline Beecham Pharmaceuticals

Manor Royal, Crawley

West Sussex RH10 9QJ

Nagy-Britannia

vagy

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA

Ul. Grunwaldzka 61-322

Poznan

Lengyelország

vagy

Glaxo Wellcome S.A.

Avenida de Extremadura 3.

09400 Aranda de Duero

Burgos

Spanyolország

Requip-Modutab 2 mg retard filmdobletta:

OGYI-T-6200/03 (28x)
OGYI-T-6200/04 (42x)
OGYI-T-6200/20 (84x)

Requip-Modutab 4 mg retard filmdobletta:

OGYI-T-6200/05 (28x)
OGYI-T-6200/21 (84x)

Requip-Modutab 8 mg retard filmdobletta:

OGYI-T-6200/06 (28x)
OGYI-T-6200/22 (84x)

A betegtájékoztató legutóbbi felülvizsgálatának dátuma: 2019. augusztus